

23 SETTEMBRE 2021
WEBINAR

TAVOLA ROTONDA

**SINTOMI SECONDARI
DEL REFLUSSO
FARINGO LARINGE:
STENOSI TUBARICA
E ACUFENI**

REFERENTE SCIENTIFICO:

Prof. Aldo Messina

Responsabile Centro Otoneurologico
Regina Margherita - Palermo



PROVIDER ECM E
SEGREGTERIA ORGANIZZATIVA

MAYA Idee
md

RAZIONALE

SINTOMI SECONDARI DEL REFLUSSO FARINGO LARINGE: STENOSI TUBARICA E ACUFENI

La Patologia da Reflusso Gastro Esofageo (mRGE ed, in inglese GERD, Gastro-Esophageal Reflux Disease o GORD, Gastro-Oesophageal Reflux disease) è una patologia estremamente frequente (8-33% della popolazione) ed è di prevalente, ma non esclusivo, interesse gastroenterologico.

Il coinvolgimento otorinolaringoiatrico è dovuto al fatto che questa condizione può determinare l'insorgenza di una localizzazione del processo patologico a livello faringo laringeo (mRFL). La mRFL inoltre, se instaurata, può divenire indipendente dalla mRGE. Sono già noti i sintomi atipici della mRGE: disfagia, odinofagia, dolore toracico similanginoso (che può indurre erroneamente a sospettare un infarto del miocardio), tosse, disfonia, "reclage" e laringopatie.

La nostra attenzione è invece rivolta a quella sintomatologia che, seppur presente, non è stata ancora completamente validata e che è di maggior appannaggio della forma faringo laringea: congiuntiviti, tubariti, otiti e acufeni.

Desideriamo conoscere non solo la prevalenza, anche nel bambino, di questi ultimi sintomi ma anche le relative possibilità terapeutiche e di profilassi.

INFORMAZIONI

Durata:

2 ore dalle ore 18.30 alle 20.30

PER ACCEDERE ALLA TAVOLA ROTONDA CLICCARE IL LINK SOTTOSTANTE

<https://zoom.us/j/7335941418?pwd=NTByNmdbQVhYRFN5U3VROVAxRFZ1Zz09>

con il contributo non condizionante di:

ALFASIGMA 

CONTATTI ASSISTENZA TECNICA:  091 541042

 antonella.militello@mayaideesud.it